

# 农业农村部农药管理司

---

农农（农药）〔2020〕21号

## 关于征求《特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）》意见的函

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

根据《农药登记管理办法》和《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案（2015—2020年）》有关要求，为指导省级农业农村部门制定尚无登记农药可用的特色小宗作物的临时用药措施，确保膳食风险可控，同时，降低特色小宗作物用药登记成本，调动农药企业的登记积极性，加快解决我国特色小宗作物“无药可用”“无标可依”难题，我司在组织广泛调研、专家论证和残留验证试验的基础上，编制了《特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）》。现印发给你们，请提出修改意见并于2020年4月17日前将纸质版和电子版提交我司。

联系人：农业农村部农药管理司农药管理处 李好，联系电话：010-59193280，电子邮箱：pmd@agri.gov.cn，邮

寄地址：北京市朝阳区农展馆南里 11 号农业农村部农药管理司农药管理处。

农业农村部农药检定所残留审评处 罗媛媛，联系电话：010-59194077，电子邮箱：nyclbz@agri.gov.cn。

附件：特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）



抄送：农业农村部农药检定所

特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）

| 序号 | 农药   |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注         |
|----|------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|------------|
|    | 通用名称 | 剂型    |      |                     |        |      |          |            |
| 1  | 阿维菌素 | 乳油    | 百合   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 2  | 阿维菌素 | 乳油    | 菠萝   | 20毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 3  | 阿维菌素 | 乳油    | 蚕豆   | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 4  | 阿维菌素 | 乳油    | 大蒜   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 5  | 阿维菌素 | 乳油    | 番木瓜  | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 6  | 阿维菌素 | 乳油    | 甘蔗   | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 7  | 阿维菌素 | 微乳剂   | 黄秋葵  | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 8  | 阿维菌素 | 乳油    | 火龙果  | 33.33毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 9  | 阿维菌素 | 乳油    | 金银花  | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 3        |            |
| 10 | 阿维菌素 | 乳油    | 荔枝   | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 11 | 阿维菌素 | 乳油    | 龙眼   | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 12 | 阿维菌素 | 乳油    | 绿豆   | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 13 | 阿维菌素 | 乳油    | 芒果   | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 21       |            |
| 14 | 阿维菌素 | 乳油    | 猕猴桃  | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 15 | 阿维菌素 | 乳油    | 茉莉花  | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 16 | 阿维菌素 | 乳油    | 三七   | 30克/公顷              | 3      | 喷雾   | 21       |            |
| 17 | 阿维菌素 | 颗粒剂   | 山药   | 262.5克/公顷           | 1      | 沟施   | —        | 苗前<br>土壤处理 |
| 18 | 阿维菌素 | 乳油    | 山楂   | 6毫克/公斤              | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 19 | 阿维菌素 | 乳油    | 丝瓜   | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 20 | 阿维菌素 | 颗粒剂   | 甜瓜   | 262.5克/公顷           | 1      | 沟施   | —        | 苗前<br>土壤处理 |
| 21 | 阿维菌素 | 微乳剂   | 豌豆   | 10.8克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 22 | 阿维菌素 | 乳油    | 香蕉   | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 23 | 阿维菌素 | 乳油    | 洋葱   | 18克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 24 | 阿维菌素 | 乳油    | 油桃   | 18毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 25 | 阿维菌素 | 颗粒剂   | 紫薯   | 262.5克/公顷           | 1      | 沟施   | —        | 苗前<br>土壤处理 |
| 26 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 菜薹   | 1050克/公顷            | 3      | 喷雾   | 7        |            |
| 27 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 大葱   | 1050克/公顷            | 3      | 喷雾   | 7        |            |
| 28 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 枸杞   | 750克/公顷             | 1      | 喷雾   | 7        |            |
| 29 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 花椰菜  | 1050克/公顷            | 3      | 喷雾   | 7        |            |
| 30 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 芥蓝   | 1050克/公顷            | 3      | 喷雾   | 7        |            |
| 31 | 百菌清  | 可湿性粉剂 | 人参   | 2400克/公顷            | 3      | 喷雾   | 28       |            |
| 32 | 百菌清  | 悬浮剂   | 三七   | 2400克/公顷            | 3      | 喷雾   | 21       |            |

| 序号 | 农药    |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|----|-------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|    | 通用名称  | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 33 | 百菌清   | 可湿性粉剂 | 蔬菜   | 900克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 34 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 菠菜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 35 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 菠萝   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 36 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 葱    | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 37 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 冬瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 38 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 豆瓣菜  | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 39 | 苯醚甲环唑 | 可湿性粉剂 | 番木瓜  | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 40 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 高粱   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 21       |    |
| 41 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 火龙果  | 150毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 42 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 茭白   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 35       |    |
| 43 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 莲雾   | 150毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 44 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 猕猴桃  | 150毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 45 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 茉莉花  | 100毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 46 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 南瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 47 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 丝瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 48 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 甜瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 49 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 西葫芦  | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 50 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 杨梅   | 150毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 51 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 油麦菜  | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 52 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 芝麻   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 53 | 苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 紫薯   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 54 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 蚕豆   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 55 | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 朝鲜蓟  | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 56 | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 大麦   | 42克/公顷              | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 57 | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 大蒜   | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 58 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 冬瓜   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 59 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 番木瓜  | 50毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 60 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 番石榴  | 150毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 61 | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 甘薯   | 31.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 62 | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 黄花菜  | 31.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 63 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 豇豆   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 64 | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 茭白   | 31.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 65 | 吡虫啉   | 微乳剂   | 金橘   | 100毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 66 | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 金银花  | 62.5毫克/公斤           | 1      | 喷雾   | 5        |    |
| 67 | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 芦笋   | 31.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 5        |    |



| 序号  | 农药    |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|-------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称  | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 68  | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 绿豆   | 262.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 69  | 吡虫啉   | 微乳剂   | 南瓜   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 70  | 吡虫啉   | 微乳剂   | 柠檬   | 100毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 71  | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 双孢蘑菇 | 4000克/公顷            | 1      | 菇床喷雾 | 7        |    |
| 72  | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 甜瓜   | 31.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 73  | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 豌豆   | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 25       |    |
| 74  | 吡虫啉   | 可湿性粉剂 | 豌豆   | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 75  | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 燕麦   | 42克/公顷              | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 76  | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 油麦菜  | 21克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 77  | 吡虫啉   | 水分散粒剂 | 芝麻   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 78  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 百合   | 126克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 79  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 大麦   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 80  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 豆瓣菜  | 126克/公顷             | 1      | 喷雾   | 5        |    |
| 81  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 高粱   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 21       |    |
| 82  | 吡蚜酮   | 可湿性粉剂 | 枸杞   | 125毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 83  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 花椰菜  | 126克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 84  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 芥蓝   | 126克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 85  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 绿豆   | 187.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 86  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 叶用莴苣 | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 87  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 茎用莴苣 | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 88  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 燕麦   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 89  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 洋葱   | 126克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 90  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 油麦菜  | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 91  | 吡蚜酮   | 水分散粒剂 | 芝麻   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 92  | 吡啶醚菌酯 | 悬浮剂   | 菠菜   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 93  | 吡啶醚菌酯 | 悬浮剂   | 菠萝   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 94  | 吡啶醚菌酯 | 悬浮剂   | 菜薹   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 95  | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 葱    | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 96  | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 冬瓜   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 97  | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 豆瓣菜  | 75克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 98  | 吡啶醚菌酯 | 悬浮剂   | 番木瓜  | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 99  | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 甘蔗   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 100 | 吡啶醚菌酯 | 悬浮剂   | 枸杞   | 200毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 101 | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 花椰菜  | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 102 | 吡啶醚菌酯 | 乳油    | 黄花菜  | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |

| 序号  | 农药    |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|-------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称  | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 103 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 火龙果  | 250毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 104 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 芥菜   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 105 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 芥蓝   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 106 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 金橘   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 107 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 莲雾   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 108 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 龙眼   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 109 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 芦笋   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 110 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 绿豆   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 111 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 猕猴桃  | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 112 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 南瓜   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 113 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 柠檬   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 114 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 枇杷   | 250毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 115 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 茄子   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 116 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 芹菜   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 117 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 人参   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 28       |    |
| 118 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 柿子   | 250毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 119 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 水芹   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 120 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 丝瓜   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 121 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 无花果  | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 122 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 茺菁   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 123 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 西葫芦  | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 124 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 向日葵  | 187.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 125 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 杏    | 250毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 126 | 吡唑醚菌酯 | 悬浮剂   | 杨梅   | 250毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 127 | 吡唑醚菌酯 | 水分散粒剂 | 杨桃   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 128 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 油麦菜  | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 129 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 柚子   | 250毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 130 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 芋    | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 131 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 芝麻   | 150克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 132 | 吡唑醚菌酯 | 乳油    | 紫薯   | 150克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 133 | 丙环唑   | 乳油    | 百合   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 134 | 丙环唑   | 乳油    | 葱    | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 135 | 丙环唑   | 乳油    | 大蒜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 136 | 丙环唑   | 乳油    | 枸杞   | 50毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 3        |    |
| 137 | 丙环唑   | 乳油    | 芹菜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |

| 序号  | 农药   |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称 | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 138 | 丙环唑  | 乳油    | 燕麦   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 28       |    |
| 139 | 丙环唑  | 乳油    | 洋葱   | 120克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 140 | 丙森锌  | 可湿性粉剂 | 苦瓜   | 1500克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 141 | 丙森锌  | 可湿性粉剂 | 荔枝   | 1333毫克/公斤           | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 142 | 丙森锌  | 可湿性粉剂 | 甜瓜   | 1500克/公顷            | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 143 | 丙森锌  | 可湿性粉剂 | 茎用莴苣 | 1500克/公顷            | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 144 | 虫螨腈  | 悬浮剂   | 火龙果  | 200毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 145 | 虫螨腈  | 悬浮剂   | 猕猴桃  | 120毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 146 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 百合   | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 147 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 葱    | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 148 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 番木瓜  | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 149 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 黄秋葵  | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 150 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 甜瓜   | 216克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 151 | 虫酰肼  | 悬浮剂   | 甜椒   | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 152 | 除虫菊素 | 水乳剂   | 枸杞   | 25毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 3        |    |
| 153 | 春雷霉素 | 水剂    | 猕猴桃  | 66.7毫克/公斤           | 1      | 喷雾   | 14       |    |
| 154 | 吡螨灵  | 乳油    | 猕猴桃  | 50毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 155 | 代森锰锌 | 水分散粒剂 | 火龙果  | 2000毫克/公斤           | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 156 | 代森锌  | 可湿性粉剂 | 百合   | 3000克/公顷            | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 157 | 代森锌  | 可湿性粉剂 | 芒果   | 1143毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 158 | 代森锌  | 可湿性粉剂 | 甜瓜   | 1950克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 159 | 敌敌畏  | 乳油    | 香蕉   | 800毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 160 | 丁醚脲  | 乳油    | 菜薹   | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 161 | 丁醚脲  | 乳油    | 花椰菜  | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 162 | 丁醚脲  | 乳油    | 芥蓝   | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 163 | 啶虫脒  | 水分散粒剂 | 百合   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 164 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 菜豆   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 165 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 蚕豆   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 166 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 大蒜   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 167 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 冬瓜   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 168 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 豆瓣菜  | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 169 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 番木瓜  | 16毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 170 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 甘蔗   | 50克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 171 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 黄秋葵  | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 172 | 啶虫脒  | 水分散粒剂 | 火龙果  | 100毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |



| 序号  | 农药   |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称 | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 173 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 金橘   | 16.67毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 174 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 韭菜   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 175 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 苦瓜   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 176 | 啶虫脒  | 乳油    | 茉莉花  | 33毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 177 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 南瓜   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 178 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 柠檬   | 16.67毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 179 | 啶虫脒  | 水分散粒剂 | 甜瓜   | 36.75克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 180 | 啶虫脒  | 可湿性粉剂 | 甜椒   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 181 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 豌豆   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 182 | 啶虫脒  | 可湿性粉剂 | 西葫芦  | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 183 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 香蕉   | 50毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 184 | 啶虫脒  | 可湿性粉剂 | 杨梅   | 16.67毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 185 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 洋葱   | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 186 | 啶虫脒  | 可溶粉剂  | 叶用莴苣 | 36克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 187 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 菠菜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 188 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 葱    | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 189 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 大蒜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 190 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 冬瓜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 191 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 豆瓣菜  | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 192 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 番木瓜  | 1000毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 193 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 花椰菜  | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 194 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 韭菜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 195 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 苦瓜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 196 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 芦笋   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 197 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 芒果   | 1000毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 198 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 南瓜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 199 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 山楂   | 1000毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 200 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 丝瓜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 201 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 茎用莴苣 | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 202 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 叶用莴苣 | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 203 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 油麦菜  | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 204 | 毒死蜱  | 乳油    | 枸杞   | 480毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 205 | 毒死蜱  | 乳油    | 绿豆   | 750克/公顷             | 2      | 喷雾   | 21       |    |
| 206 | 毒死蜱  | 乳油    | 猕猴桃  | 450毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 207 | 毒死蜱  | 乳油    | 杏    | 320毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |    |



| 序号  | 农药   |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注         |
|-----|------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|------------|
|     | 通用名称 | 剂型    |      |                     |        |      |          |            |
| 208 | 多菌灵  | 可湿性粉剂 | 芥菜   | 1500克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 209 | 多菌灵  | 可湿性粉剂 | 苦瓜   | 1000毫克/公斤           | 3      | 喷淋   | 7        |            |
| 210 | 多菌灵  | 可湿性粉剂 | 绿豆   | 400毫克/公斤            | 2      | 喷淋   | 14       |            |
| 211 | 多菌灵  | 可湿性粉剂 | 芝麻   | 400毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |            |
| 212 | 多抗霉素 | 可湿性粉剂 | 猕猴桃  | 210克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 213 | 噁霉灵  | 水剂    | 菜豆   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 214 | 噁霉灵  | 水剂    | 蚕豆   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 215 | 噁霉灵  | 水剂    | 花椰菜  | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 14       |            |
| 216 | 噁霉灵  | 水剂    | 黄花菜  | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 217 | 噁霉灵  | 水剂    | 苦瓜   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 218 | 噁霉灵  | 水剂    | 猕猴桃  | 1.05克/平方米           | 1      | 灌根   | —        | 芽前<br>土壤处理 |
| 219 | 噁霉灵  | 水剂    | 茄子   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 220 | 噁霉灵  | 水剂    | 丝瓜   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 3        |            |
| 221 | 噁霉灵  | 水剂    | 甜瓜   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 10       |            |
| 222 | 噁霉灵  | 水剂    | 豌豆   | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 223 | 噁霉灵  | 水剂    | 西葫芦  | 1.05克/平方米           | 2      | 喷淋   | 7        |            |
| 224 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 菠菜   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 225 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 菜薹   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 226 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 大蒜   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 14       |            |
| 227 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 花椰菜  | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 228 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 黄秋葵  | 115克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 229 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 芥蓝   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 230 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 韭菜   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 231 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 甜瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 232 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 甜椒   | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 233 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 茎用莴苣 | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 234 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 叶用莴苣 | 115.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 235 | 呋虫胺  | 可湿性粉剂 | 油麦菜  | 45克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |            |
| 236 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 枣    | 500毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 237 | 呋虫胺  | 水分散粒剂 | 芝麻   | 262.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 10       |            |
| 238 | 氟啶胺  | 悬浮剂   | 菜薹   | 262.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 7        |            |
| 239 | 氟啶胺  | 悬浮剂   | 葱    | 250克/公顷             | 2      | 喷雾   | 10       |            |
| 240 | 氟啶胺  | 悬浮剂   | 大蒜   | 250克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |            |
| 241 | 氟啶胺  | 悬浮剂   | 冬瓜   | 250克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |            |
| 242 | 氟啶胺  | 悬浮剂   | 番木瓜  | 175毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |            |

| 序号  | 农药      |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称    | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 243 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 花椰菜  | 262.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 244 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 芥菜   | 262.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 245 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 芥蓝   | 262.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 246 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 韭菜   | 250克/公顷             | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 247 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 菊花   | 300克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 248 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 苦瓜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 249 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 南瓜   | 250克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 250 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 茄子   | 250克/公顷             | 3      | 喷雾   | 7        |    |
| 251 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 三七   | 250克/公顷             | 3      | 喷雾   | 21       |    |
| 252 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 丝瓜   | 250克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 253 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 蕹菜   | 120克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 254 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 茺菁   | 247.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 255 | 氟啶胺     | 悬浮剂   | 洋葱   | 250克/公顷             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 256 | 氟硅唑     | 乳油    | 番木瓜  | 100毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 257 | 氟硅唑     | 乳油    | 枸杞   | 53.33毫克/公斤          | 1      | 喷雾   | 7        |    |
| 258 | 氟环唑     | 悬浮剂   | 百合   | 131.25克/公顷          | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 259 | 氟氯氰菊酯   | 水乳剂   | 高粱   | 34.1克/公顷            | 2      | 喷雾   | 21       |    |
| 260 | 氟氯氰菊酯   | 水乳剂   | 猕猴桃  | 19毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 261 | 氟氯氰菊酯   | 乳油    | 桃    | 25毫克/公斤             | 3      | 喷雾   | 14       |    |
| 262 | 氟氯氰菊酯   | 水乳剂   | 茎用莴苣 | 34.1克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 263 | 氟氯氰菊酯   | 水乳剂   | 油麦菜  | 27克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 264 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 菠菜   | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 265 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 葱    | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 266 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 大蒜   | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 267 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 豆瓣菜  | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 268 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 花椰菜  | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 269 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 茎用莴苣 | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 270 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 叶用莴苣 | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 271 | 腐霉利     | 可湿性粉剂 | 油麦菜  | 450克/公顷             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 272 | 复硝酚钠    | 水剂    | 猕猴桃  | 7.2毫克/公斤            | 1      | 喷雾   | 14       |    |
| 273 | 高效氯氟氰菊酯 | 微乳剂   | 菠萝   | 27克/公顷              | 1      | 根部喷淋 | 14       |    |
| 274 | 高效氯氟氰菊酯 | 微乳剂   | 高粱   | 7.5克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 275 | 高效氯氟氰菊酯 | 微乳剂   | 黄秋葵  | 18.75克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 276 | 高效氯氟氰菊酯 | 微乳剂   | 金橘   | 31.25毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 277 | 高效氯氟氰菊酯 | 水乳剂   | 苦瓜   | 18.75克/公顷           | 2      | 喷雾   | 5        |    |

| 序号  | 农药              |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注 |
|-----|-----------------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|----|
|     | 通用名称            | 剂型    |      |                     |        |      |          |    |
| 278 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 莲雾   | 8.33毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 279 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 绿豆   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 280 | 高效氯氟氰菊酯         | 乳油    | 猕猴桃  | 16.7毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 281 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 柠檬   | 31.25毫克/公斤          | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 282 | 高效氯氟氰菊酯         | 乳油    | 人参   | 27克/公顷              | 2      | 喷雾   | 28       |    |
| 283 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 三七   | 30克/公顷              | 2      | 喷雾   | 21       |    |
| 284 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 甜瓜   | 11.25克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 285 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 甜椒   | 18.75克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 286 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 西葫芦  | 18.75克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 287 | 高效氯氟氰菊酯         | 乳油    | 西葫芦  | 22.5克/公顷            | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 288 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 香蕉   | 27.8毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 289 | 高效氯氟氰菊酯         | 水乳剂   | 向日葵  | 27克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 290 | 高效氯氟氰菊酯         | 乳油    | 赤豆   | 37.5克/公顷            | 1      | 喷雾   | 14       |    |
| 291 | 高效氯氟氰菊酯         | 微乳剂   | 芥蓝   | 27克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 292 | 高效氯氟氰菊酯         | 乳油    | 山楂   | 12.5毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 10       |    |
| 293 | 高效氯氟氰菊酯         | 水乳剂   | 双孢蘑菇 | 450克/公顷             | 1      | 喷雾   | 7        |    |
| 294 | 咯菌腈             | 可湿性粉剂 | 三七   | 112.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 21       |    |
| 295 | 己唑醇             | 悬浮剂   | 枸杞   | 33.3毫克/公斤           | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 296 | 己唑醇             | 悬浮剂   | 猕猴桃  | 75毫克/公斤             | 3      | 喷雾   | 21       |    |
| 297 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 菜豆   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 5        |    |
| 298 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 葱    | 3克/公顷               | 1      | 喷雾   | 7        |    |
| 299 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 番木瓜  | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 300 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 甘蔗   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 301 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 高粱   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 302 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 黄秋葵  | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 3        |    |
| 303 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 苦瓜   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 304 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 荔枝   | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |    |
| 305 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 龙眼   | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |    |
| 306 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 芒果   | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |    |



| 序号  | 农药              |       | 适用作物 | 每次最高用药量<br>(按有效成分计) | 最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期(天) | 备注   |
|-----|-----------------|-------|------|---------------------|--------|------|----------|------|
|     | 通用名称            | 剂型    |      |                     |        |      |          |      |
| 307 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 猕猴桃  | 10毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |      |
| 308 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 茄子   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 3        |      |
| 309 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 甜瓜   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 310 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 甜椒   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 311 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 蕹菜   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 5        |      |
| 312 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 乳油    | 西葫芦  | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 313 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 香蕉   | 10克/公顷              | 2      | 喷雾   | 5        |      |
| 314 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 向日葵  | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 315 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 燕麦   | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 14       |      |
| 316 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | 微乳剂   | 油麦菜  | 3克/公顷               | 2      | 喷雾   | 3        |      |
| 317 | 甲基硫菌灵           | 悬浮剂   | 菠菜   | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 318 | 甲基硫菌灵           | 悬浮剂   | 豆瓣菜  | 937.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 3        |      |
| 319 | 甲基硫菌灵           | 可湿性粉剂 | 枸杞   | 875毫克/公斤            | 1      | 喷雾   | 7        |      |
| 320 | 甲基硫菌灵           | 可湿性粉剂 | 猕猴桃  | 875毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 28       |      |
| 321 | 甲基硫菌灵           | 可湿性粉剂 | 粟    | 1050克/公顷            | 1      | 喷雾   | 28       |      |
| 322 | 甲基硫菌灵           | 悬浮剂   | 茎用莴苣 | 337.5克/公顷           | 3      | 喷雾   | 7        |      |
| 323 | 甲基硫菌灵           | 悬浮剂   | 香蕉   | 875毫克/公斤            | 3      | 喷雾   | 14       |      |
| 324 | 甲基硫菌灵           | 悬浮剂   | 油麦菜  | 337.5克/公顷           | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 325 | 甲氰菊酯            | 水乳剂   | 猕猴桃  | 200毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 14       |      |
| 326 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 菜薹   | 90克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 327 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 花椰菜  | 90克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 328 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 荔枝   | 96毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 329 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 龙眼   | 96毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 330 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 蕹菜   | 90克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 331 | 甲氧虫酰肼           | 悬浮剂   | 洋葱   | 90克/公顷              | 2      | 喷雾   | 7        |      |
| 332 | 啶啉铜             | 悬浮剂   | 猕猴桃  | 335毫克/公斤            | 1      | 喷雾   | 14       |      |
| 333 | 联苯肼酯            | 悬浮剂   | 菠萝   | 240毫克/公斤            | 2      | 喷雾   | 28       |      |
| 334 | 联苯肼酯            | 悬浮剂   | 绿豆   | 100克/公顷             | 2      | 喷雾   | 14       |      |
| 335 | 联苯菊酯            | 微乳剂   | 猕猴桃  | 25毫克/公斤             | 2      | 喷雾   | 14       |      |
| 336 | 联苯菊酯            | 水乳剂   | 油茶   | 30毫克/公斤             | 1      | 喷雾   | —        | 花前喷雾 |